

# クビアカツヤカミキリ

## の情報提供に御協力ください


栃木県南西部で**特定外来生物クビアカツヤカミキリ**の被害が拡大しています。幼虫が**モモ、スモモ、ウメ、サクラ**に寄生し、内部を食い荒らすことで、樹木は最終的に**枯れてしまいます**。

さらなる被害の拡大を防ぐために、皆さんからの情報提供が必要です。

写真を参考に成虫やフラス（幼虫のフンと木くず）を見つけた場合には、下記のお問合せ先まで御連絡ください。

### 成虫の特徴

- 全体に**光沢のある黒色で、胸部(クビの部分)が赤い**
- 成虫は6月から8月に現れる
- 捕まえると刺激臭を発することがある
- 体長は2～4cm



成虫

幼虫



幼虫が入り込んだ樹木からは、**大量のフラス（幼虫のフンと木くずが混ざったもの）が排出されるので、目印となります。**

クビアカツヤカミキリ（ほぼ実物大）

〈お問合せ先〉

お住いの 市役所・町役場

高根沢町役場 産業課

矢板森林管理事務所

栃木県農業環境指導センター防除課

栃木県農政部経営技術課

栃木県環境森林部自然環境課

電話：028-675-8104

電話：0287-43-0427

電話：028-626-3086

電話：028-623-2286

電話：028-623-3207

## 被害例



被害によって枯れてしまったモモ園



幹に開いた成虫の羽化脱出口



樹木を食い荒らす幼虫



赤茶色のフラスが株元に積もったサクラ（左）とモモ（右）



うどん状のフラスを幹から排出



地表に落下したフラス

防除に関する詳細は

### 「クビアカツヤカミキリ防除対策マニュアル」

をご覧ください。

栃木県 クビアカ 防除対策マニュアル



#### ★クビアカツヤカミキリを見つけたら…

- ・裏面のお問い合わせ先に御連絡の上、発見場所、発見日等をお伝えください。
- ・成虫は見つけたら踏みつぶす等して捕殺してください。

#### ～可能であれば御協力いただきたいこと～

- ・写真を撮影してください。（フラスの拡大写真や株元の様子が見える写真）
- ・木の幹で見つけた場合には、樹種をお知らせください。

－御注意－

イチジク、ツツジ類（ドウダンツツジなど）、カエデ（モミジ）類等については、クビアカツヤカミキリの寄生事例はありません。フラスが出ている場合は、在来カミキリムシの被害と考えられます。

#### 特定外来生物



クビアカツヤカミキリは特定外来生物に指定され、**生きたままの運搬や飼育、販売等が禁止**されており、違反した場合には罰則があります。